



SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile


Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2015

Ficha Técnica Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

- Estudio bienal realizado desde 1995: versión décimo primera. Desde 2001 el estudio es responsabilidad de CONACE en las primeras versiones y luego de SENDA.
- Muestreo aleatorio y en dos etapas.
- Muestra representativa a nivel nacional y regional.
- n = 54.823 estudiantes de 8º básico a 4º medio de establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados que representan a 961.727 personas de 15 regiones y 121 comunas del país.
- Periodo de levantamiento: Octubre – Diciembre 2015.
- Tipo de encuesta: auto-administrado en sala de clases.
- Modalidad de compra: Licitación pública.
- Trabajo de campo: Empresa Adimark GfK.
- Procesamiento de datos: Observatorio Chileno de Drogas.
- Cálculo de variación a un nivel de confianza de un 95%.
- Error estándar prevalencia último año drogas ilícitas: 0,45%

Evolución prevalencias consumo de tabaco y alcohol.


Total país, 2001-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo de uso frecuente de tabaco.


Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo. Total país, 2005-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol durante el último mes, según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Distribución de consumo y presencia de a lo menos un episodio de embriaguez de alcohol en último mes.


Total país, 2015



Dos de cada tres estudiantes (219.796) que dicen haber consumido alcohol durante el último mes también declaran haber tenido a lo menos un episodio de embriaguez en los últimos 30 días.

Evolución de la proporción de prevalentes mes de alcohol que declara haber bebido 5 o más tragos en al menos una ocasión durante el último mes, según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo de uso diario de alcohol.


Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo. Total país, 2005-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución prevalencias consumo de marihuana en el último año.


Total país, 2001-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia de consumo de marihuana durante el último año, según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Distribución de consumo y consumo de alto riesgo de marihuana en último año.


Total país, 2015



328.567 (34,2%) escolares declararon haber consumido marihuana en el último año. 35.519 de ellos (1 de cada 5) presentaron consumo de alto nivel de riesgo a esta droga.

Evolución de la prevalencia consumo de alto riesgo de marihuana (Escala CAST ≥ 4), según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%


Evolución de la tasa de incidencia marihuana en el último año (número de estudiantes que consumieron por primera vez).

Total país, 2001-2015




Evolución de la percepción de riesgo de uso frecuente de marihuana.

Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo. Total país, 2001-2015



Evolución prevalencias consumo de cocaína en el último año.


Total país, 2001-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína durante el último año, según sexo, curso y dependencia administrativa.


Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo uso frecuente de cocaína.


Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo. Total país, 2005-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución prevalencias consumo de pasta base en el último año.


Total país, 2001-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base durante el último año, según sexo, curso y dependencia administrativa.

Total país, 2013-2015



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia consumo sustancias inhalables y tranquilizantes sin receta médica.

Total país, 2001-2015

