



Estudio uso de alcohol y otras drogas en población de 60 años o más

PRINCIPALES RESULTADOS



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

Santiago, Agosto 2021.



Ficha Técnica

- Encuesta telefónica a 3.503 personas de 60 años o más, en las 16 regiones del país.
- Representativa a nivel nacional.
- Periodo de aplicación: 6 de abril al 6 de mayo de 2021.
- Trabajo de campo: CADEM.
- Análisis de datos: Observatorio Nacional de Drogas.

Características de la muestra



51,7% hombres y 48,3% mujeres.



70,0% entre 60 y 70 años y 30,0% de 71 años y más.



18,9% con educación básica o menos, 37,7% con educación media, 43,3% con educación superior o postgrado.

Características de la muestra

49,1% vive con su familia, 28,1% vive con su pareja, 18,0% vive solo y 4,8% vive con otra persona.



40,7% trabajó al menos una hora la semana pasada.


22,4% de los desocupados ejerce el rol de cuidador de algún miembro de su familia.




39,0% se sintió triste la mayor parte del día o todos los días durante las últimas dos semanas.

Módulo consumo de alcohol

Consumo de alcohol (mes), según sexo, edad y educación (%).




Consumidores de alcohol (mes) que declaran haberse embriagado*, según sexo, edad y educación (%).




* Embriaguez: 3 o más tragos para hombre, 2 o más tragos para mujeres en al menos una ocasión durante el último mes.

¿Ha cambiado su consumo de alcohol desde el inicio de las restricciones por Covid-19? (%)




* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.

Consumo de alcohol (mes), según estudios en distintas poblaciones (%)




Módulo consumo de medicamentos sin receta médica

Consumo de **medicamentos sin receta médica (año)***, según sexo, edad y educación (%)



* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).


Razones de consumo de medicamentos sin receta médica (año)* (%)



* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

* Se omiten respuestas "No sabe, no responde" y "Otra razón". Sólo considera respuestas de consumidores año.


¿Ha cambiado su consumo de **medicamentos sin receta médica*** desde el inicio de las restricciones por **Covid-19?** (%)



* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).

* Se omiten respuestas "No sabe, no responde". Sólo considera respuestas de consumidores de último año.

Consumo de **medicamentos sin receta médica (año)***, según estudios en distintas poblaciones (%)




* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin).


* Para población general, educación superior y 60 años y más, corresponde a tranquilizantes sin receta médica y analgésicos sin receta médica. En población escolar sólo corresponde a tranquilizantes sin receta médica.

Módulo consumo de marihuana

Consumo de **marihuana (año)**, según sexo, edad y educación (%).




Fuente de **obtención** de marihuana en consumidores de **marihuana (año)** (%)




* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.

En el último año ¿Ha consumido **marihuana** por alguna de las siguientes vías? (%)




* Se omite categoría "otros". Sólo considera respuestas de consumidores de último año. Pregunta de respuesta múltiple.

¿Ha cambiado su consumo de **marihuana** desde el inicio de las restricciones por **Covid-19**? (%)



* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.


Consumo de **marihuana (año)**, según estudios en distintas poblaciones (%)




Módulo consumo de otras drogas

Consumo de otras drogas (vida y año) (%)

Prevalencia vida




Prevalencia año




Módulo percepción de riesgo

Percepción de riesgo alto para alcohol y otras drogas (%)



Percepción de riesgo alto para alcohol y otras drogas (%), según estudios en distintas poblaciones (%)



Alcohol diario en población escolar refiere a “uno o dos tragos de alcohol todos o casi todos los días”. En otras poblaciones, refiere a “cinco o más tragos diariamente”.

Principales conclusiones

Principales conclusiones

- Los consumos más altos en las personas de 60 años y más, se registran en alcohol y medicamentos sin receta médica:
 - 2 de cada 5 personas manifiestan consumir alcohol en el último mes.
 - 2 de cada 3 consumidores de alcohol en el último mes manifiestan haberse embriagado.
 - 1 de cada 10 personas mencionan consumir medicamentos sin receta médica en el último año.
- Las personas de 60 años y más presentan un consumo bajo en otras sustancias (marihuana, cocaína, LSD, pasta base, éxtasis).
- Las restricciones del Covid-19 presentan un impacto bajo en el consumo de alcohol y otras drogas en personas de 60 años y más.



SENDA



#eligevivir
— SIN DROGAS —

